


వ్యాధిప్రత తక్కువ ఉన్నప్పుడు రాట్ ఫిక్స్ వాడు విధానము

వ్యాధిప్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రాట్ ఫిక్స్ వాడు విధానము



- వ్యాధి సోకని మొక్కలు
- వ్యాధిగ్రస్త మొక్కలు

సూచనలు

- చనిపోయిన మొక్కలను తొలగించి కాల్చి వేసి, భూమికి సూర్యరశ్మి సోకునట్లు చేయడం వలన భూమిలోపల శీలీంధ్రం చాలా వరకు నాశనమగును.
- వ్యాధి సోకిన ప్రదేశంలో మొక్కలను తిరిగి నాటునప్పుడు 0.4% రాట్ ఫిక్స్ ద్రావణంలో 20 నిముషాల పాటు ఉంచి నాటుకోవాలి.
- వ్యాప్తిని నిరోధించడానికి, వ్యాధి సోకిన మొక్క చుట్టు ఉన్న మొక్కలకు కూడా రాట్ ఫిక్స్ ద్రావణాన్ని వేయాలి.
- వ్యాధి ప్రారంభదశలో, అనగా ఆకులు ఎండి పోయి రాలినప్పుడే రాట్ ఫిక్స్ ద్రావణాన్ని వాడాలి.
- రాట్ ఫిక్స్ ద్రావణం వేసిన 2-3 రోజుల తర్వాత మొక్కలకు నీరందించాలి.
- అవసరమనుకుంటే 30 రోజుల తర్వాత మరో సారి రాట్ ఫిక్స్ ని వాడాలి.
- భూమిలో సేంద్రీయ కర్షణ శాతం పెంచడానికి ఎరువులు లేదా కంపోస్టును తగిన మోతాదులో వేసుకోవాలి.
- వ్యాధి వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి భూమిలో తేమ శాతం 40% కంటే ఎక్కువ ఉండునట్లుగా చూడాలి.
- కొత్తగా తోటలు నాటుకునేటప్పుడు, భూమిని లోతుగా దున్ని సూర్యరశ్మి ప్రసరించేలా చూడాలి.

ముందు జాగ్రత్త

- రాట్ ఫిక్స్ ను గాలి చొరబడని సంచుల్లో లేక డబ్బాలలో నిల్వచేయాలి
- పిల్లలకు, జంతువులకు దూరంగా ఉంచాలి.
- రాట్ ఫిక్స్ కు సూర్యరశ్మి తగలకుండా సంచులలో చీకటి ప్రదేశాల్లో ఉంచాలి



ప్రతీష్ కుమార్, పి.ఎం.

రాజశేఖర్, కె.

శివప్రసాద్, వి.

నిర్దేశకులు

కేంద్ర పట్టు పరిశోధనా మరియు శిక్షణాలయం

కేంద్ర పట్టు మండలి, జొలి మంత్రిత్వశాఖ,

భారత ప్రభుత్వం, శ్రీరామపురం

మైసూరు - 570 008

Tel : 0821-2362757, 2362406 Fax : 0821-2362845
Web : www.csrtimys.res.in E-mail : csrtimys.csb@nic.in

రాట్ ఫిక్స్

మల్బరీలో వేరు కుళ్ళు రోగము
నియంత్రించడానికి విస్తృత
ప్రభావము గల ఔషధము



రాట్ ఫిక్స్

మల్బరీలో వేరు కుళ్ళు రోగము
నియంత్రించడానికి విస్తృత ప్రభావము
గల ఔషధము



ఇది సి.ఎస్.ఆర్.టి.బి. మైసూరు వారి ఉత్పత్తి



కేంద్ర పట్టు పరిశోధనా మరియు శిక్షణాలయం

కేంద్ర పట్టు మండలి, జొలి మంత్రిత్వశాఖ,

భారత ప్రభుత్వం, శ్రీరామపురం

మైసూరు - 570 008

వేరు కుళ్ళు రోగం

మల్బరీ పెంపకంలో వేరు కుళ్ళు రోగమన్నది చాలా తీవ్రమైన వ్యాధి. ఈ వ్యాధి అన్ని ఋతువులలో సంక్రమిస్తూ మల్బరీ తోటలు గల అన్ని ప్రాంతాలకూ విస్తరించి ఉంది. ప్యూసేరియం సొలాని, ప్యూసేరియం ఆక్సిస్పొరం, రైజోక్టోనియా బటాటికోలా మరియు బోటియోడిప్లోడియా థియోట్రోపే మొదలగు శిలీంధ్రాలు వేరు కుళ్ళు రోగానికి ముఖ్యకారణాలు.

వ్యాధి లక్షణాలు

- మల్బరీ మొక్క చూడడానికి ఎండి పోతూ, ఆకులు రాలతూ వుంటాయి.
- వేరు కుళ్ళిపోయి మొక్క చనిపోవును.
- ఈ రోగం వలన 30% వరకు మొక్కలు చనిపోయి, దాదాపుగా 14% వరకు దిగుబడి తగ్గును.
- 30-35^o సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత, మరియు 40% కంటే తక్కువ తేమశాతంగల నేలల్లో ఈ వ్యాధి త్వరగా విస్తరించును.



- ప్రారంభంలో అక్కడక్కడ కొన్ని మొక్కల్లో ఈ వ్యాధి సోకి, వ్యాధి వ్యాప్తికి కారకాలుగా మారి, ఎక్కువ మొక్కలు చనిపోవడానికి దారి తీయును.
- వ్యాధికారకజీవి మల్బరిమొక్క వేరు వ్యవస్థలోకి చేరి, నివాసము ఏర్పరుచుకుని వేరు బెరడునందు అనేకమైన నల్లటి స్పొర్లను పెంపొందించును.
- వేరువ్యవస్థ చుట్టూ ఉన్న బెరడు (పట్టు/పొర) పొడి బారడం ప్రారంభమైన తర్వాత వేరు వ్యవస్థని నిర్వీర్యం చేస్తూ కుళ్ళింప చేయును.
- వ్యాధి సంక్రమించిన మొక్కలను భూమి నుండి సులభంగా లాగివేయవచ్చును.

రాట్ ఫిక్స్ వినియోగించు విధానం



మొక్కను భూమికి 30 సెం.మీ. ఎత్తులో కత్తిరించాలి

మొక్క చుట్టు 20-30 సెం.మీ.ల మట్టిని తవ్వి బేసిన్ తీయాలి



10 గ్రాముల రాట్ ఫిక్స్ ని 2 లీటర్ల నీటిలో కలపాలి.

2 లీటర్ల రాట్ ఫిక్స్ ద్రావణాన్ని మొక్క తడిచేటట్టుగా పై నుండి పోయాలి



వెంటనే గాలి చొరబడకుండా పాదుచుట్టు మట్టిని కప్పాలి.

పాదుచుట్టు మట్టిని కప్పి బాగా అధమాలి



ఉపయోగాలు

- విస్తృత పరిధిగల మిశ్రమము, పర్యావరణ మిత్ర మరియు వేరుకుళ్ళు రోగ కారకాలయిన అన్ని శిలీంధ్రాలపై ప్రతిభావంతంగా పనిచేయును.
- వ్యాధి సోకిన ప్రారంభదశలో వాడినట్లయితే వ్యాధిని పూర్తిగా నియంత్రించ వచ్చును.
- ఈ మిశ్రమమందు 89.5% పర్యావరణానుకూల సేంద్రియ పదార్థము, మరియు 8% సేంద్రియ రసాయన పదార్థములు కలవు.
- తక్కువ ఖర్చుతో వ్యాధిని నియంత్రించవచ్చును.
- భూమిలోపల మేలు కలిగించు రైతు మిత్ర సూక్ష్మజీవులకు (రైజోబియం) ఎలాంటి హాని కలిగించదు.
- పట్టుపురుగుల పెంపకంపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావము ఉండదు
- మిశ్రమం యొక్క జీవిత కాలం రెండు సంవత్సరములుగా వుంటుంది.